Ministere de l'Agriculture SERVICE DE LA FROTECTION DES VEGETAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA

STATION

DAVERTISSEMENTS

AGRICOLES.

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON
ONTPELLIER - I6, rue de la République - Tél. M2 58.72

 2ème	année	No	27	23	Août	I954

AVERTISSEMENTS

Toutes zones

TAVELURE

Les conditions atmosphériques actuelles favorisent une évolution tardive du champignon. Des contaminations sont possibles. L'évolution du parasite peut ne pas s'observer immédiatement, les taches n'apparaissant qu'en cours de conservation des fruits.

Nous insistons vivement auprès des arboriculteurs pour qu'ils réalisent un traitement soigné, soit à l'aide des soufres micronisés, soit au Zinèbe, soit encore en utilisant le Captane.

CARPOCAPSE

Le vol de carpocapse après s'être considérablement ralenti, reprend avec une certaine intensité. Malgré l'abaissement de température, il est nécessaire de pulvériser une bouillie insecticide dès réception du présent avis.

Dans les vergers où des chutes de fruits véreux se sont produites en Juillet, il sera utile de renouveler le traitement IO jours après la première application.

Nous rappelons aux arboriculteurs que l'usage des arsenicaux n'est plus possible sur aucune variété.

TORDEUSE

Il est indispensable de commencer les traitements sur les fruits tardifs à récolter après le 15 Septembre.

INFORMATIONS

TEIGNE DU POIREAU

Ce parasite est actuellement très répandu dans toutes les cultures de la région; nous rappelons qu'il se combat aisément par des pulvérisations renouvelées de : Parathion ou de D.D.T. ou de Roténone.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux P.BERVILLE Le Contrôleur chargé des 455
Avertissements Agricoles
L.L.TROUILLON

Împrimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, I6, Rue de la République-Montpellier. Le Gérant, R. BERTRAND. Autor du 23.I.53. Reproduction, adaptation réservées